

NEWS



TOP TÉMA

A betakarított kukoricaszilázs megóvása!

**BON
SILAGE**

MAIS

A silózási veszteségek és az utómelegedés nem okozhatnak plusz tételeket a betakarítási veszteségek körében.

Az elmúlt hetek extrém időjárási viszonyai Magyarország egyes részein nagy károkat okoztak a kukoricatáblákban. A nagymértékű szárazság és a hozzá kapcsolható extrém magas hőmérséklet a kukoricacső fejlődésének elmaradásához illetve a kukorica növény károsodásához vezetett. Nagyon sok helyen a hozamok elmaradásával számolnak.

A 2013-as évben sok helyütt tapasztalhattuk már ugyanezt. A kényszerűen végbe menő érési folyamatokból származó tömegtakarmányok vizsgálati eredményei azt mutatják, hogy 25-28%-os szárazanyag tartalommal, rendkívül alacsony keményítő-, magas cukortartalommal (12%-ig) és magas nyersrost (27%-ig) tartalommal rendelkeztek ezek a szilázsok.

Összességében az mondható el, hogy a silózási folyamatokhoz rossz kiindulási helyzet áll rendelkezésre, ahol a penészek szaporodásának rizikója nagyon magas.

Az ilyen kukoricaszilázsok etetése során nagy odafigyeléssel készített takarmányozási receptúrákra van szükség.

Szívesen segítünk ebben Önnek!

Előzze meg a későbbi veszteségeket és legyen biztos a kukoricaszilázs minőségében!

TOP TÉMA

A betakarított kukoricaszilázs megóvása!

A 2013-as év tapasztalatai alapján az alábbi ajánlásokat tudjuk a kukoricaszilázs megóvásával kapcsolatban nyújtani:

1. Ne várakozzunk túl sokáig a betakarítással; a szántóföldi penészek elszaporodásának rizikója a sérült növény esetében napról napra nő
2. Kezelje teljeskörűen a szilázst **BONSILAGE MAIS** termékkel és alkalmazzon kiegészítő kezelést **SCHAUMASIL Pro NK**-val vagy **SILOSTAR PROTECT**-tel a silóterek felületén illetve a széleken
3. Mindenképpen szükséges a 6-8 hetes silóérési folyamatokat betartani.

Ne bízsa a véletlenre a szilázs minőségét!



Szignifikáns módon javítja az aerob stabilitást és emeli a kukoricaszilázs emészthetőségét.

- ✓ gátolja az utómelegedés kialakulását
- ✓ javítja az ízletességet
- ✓ emeli az emészthetőség szintjét
- ✓ csökkenti a szárazanyag veszteséget



A propionsav tartósító hatásán alapuló takarmány kiegészítő.

- ✓ kevésbé korrozív, mivel pufferelt
- ✓ nem szúrós szagú
- ✓ nem esik ADR besorolás alá
- ✓ pH értéke: ca. 4,3 - mely megfelel egy jó minőségű szilázsnak



Nagy hatékonyságú speciális termék a minőségi szilázsok felületi illetve oldalsó régióinak kezelésére.

- ✓ nagyon jó hatékonyság a penészekkel és az élesztőkkel szemben
- ✓ javítja az erjedés sikerességét
- ✓ meggátolja a sok veszteséggel járó utómelegedési folyamatokat
- ✓ alacsony szintű felhasználási mennyiség, nagy hatékonyság

Használat előtt mindenképpen olvassa el a termékek használati utasításait!

További információval kollégáink szívesen állnak az Ön rendelkezésére:

Fridinger Ferenc
+36 30 459 4940
Dunántúl



Szarvas Péter
+36 30 598 6531
Kelet-Magyarország